

LE VIGARO

24h-Blutdruckmessung (Remmler)

Zuverlässige Diagnostik / Therapiekontrolle unter Alltagsbedingungen

Indikationen

- Schwankende / nicht interpretierbare Einzelmessungen
- Verdacht auf Weisskittelhypertonie
- Verdacht auf maskierte Hypertonie
- Therapieresistenz
- Verdacht auf Hypotonien
- Abklärung des nächtlichen Dipping-Verhaltens




24h-Blutdruckmessung


- Tagsüber alle 15 min
- Nachts alle 30 min
- Führen eines Patiententagebuchs über Aktivitäten, Schlafzeiten und Beschwerden

Befund

24h-Blutdruckprofil pathologisch



24h-Blutdruckprofil normal



Optimale
Diagnostik, zuverlässige
Therapiekontrolle

Referenzwerte 24h-Blutdruckmessung

24h-Mittelwert Tag / Nacht	< 130 / 80 mmHg
Mittelwert Tag	< 135 / 85 mmHg
Mittelwert Nacht	< 120 / 70 mmHg
Dipping nachts	10 – 20% gegenüber Mittelwert Tag

Vorteile

- Bessere Abbildung von Alltagssituationen gegenüber Einzelmessungen
- Informationen über 24h-Mittelwert, Mittelwert für Tag oder Nacht, nächtliches Dipping
- Höhere Korrelation mit Hypertoniefolgeerkrankungen (Hypertensive Herzkrankheit etc.) und kardiovaskulärem Gesamtrisiko im Vergleich zu Einzelmessungen
- Ausschluss unsachgemässer Durchführung der Blutdruck-Heimmessungen
- Optimale Einstellung der antihypertensiven Therapie mit tieferen Medikamentendosen

Preis

CHF 167.–

Gerätedisposition

T +41 (0)61 486 11 11

Information

Literatur auf Anfrage
Dr. med. Petra Kohler, FMH Innere Medizin, Kardiologie, Leiterin Kardiologie
Dr. med. Ruth von Dahlen, FMH Innere Medizin, Kardiologie, Stv. Leiterin Kardiologie
Dr. med. Niclas Freund, FMH Innere Medizin, Kardiologie
Dr. med. Edelbert Imhof, FMH Innere Medizin, Pneumologie, FA Schlafmedizin

Redaktion Dr. med. Dieter Burki, FAMH Labormedizin, Bereichsleiter Produktion West
contact@viollier.ch | www.viollier.ch