**Assisted Reproductive** Technologies (ART) Cardiologie **Pathologie** Diagnostic clinique de laboratoire









183 / 08.12 L'actualité médicale vue par votre laboratoire

Dr méd. Edouard H. Viollier, FMH Médecine interne Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Valeurs cibles pour

lipémiant: LDL-cholestérol

< 4.1 mmol/L

< 3.4 mmol/L

< 2.6 mmol/L

< 1.8 mmol/L

un traitement hypo-

## Facteurs de risque cardiovasculaires

Stratification du risque et indications thérapeutiques selon le GLSA (GLSA → Groupe de travail Lipides et Athérosclérose)

Indication

Investigation pour tous dès 40 ans

Score GLSA

Calculateur en ligne → http://www.agla.ch/p10-1.html

Facteurs de risque		Points	Risque de subir, au cours des 10 prochaines années, un événeme					
	35 – 39	0	P	coronarien aigu				
Age	40 – 44	6		Points	Risque [%]	Interpréta		
	45 – 49	11		0 – 24	< 1			
	50 – 54	16	16 25 – 31 1 –	1 – 2	faible			
	55 – 59	21		32 – 41	2 – 5	Taible		
	60 – 65	26		42 – 49	5 – 10			
Antécédents familliaux	négatifs	0		50 – 58	10 – 20	intermédia		
	positifs	4	> 58		> 20	élevée*		
Fumeur	non	0				très élevé*		
	oui	8						
Tension artérielle	< 120	0		Si les affections suivantes tell				
	120 – 129	2		rienne, une athérosclérose, un				
	130 – 139	3		type 1 avec atteinte des organ				
	440 450							

Calcul individuel du risque

٨٥٥	45 – 49	11		
Age	50 – 54	16		
	55 – 59	21		
	60 – 65	26		
Antécédents	négatifs	0		
familliaux	positifs	4		
Fumeur	non	0		
rumeur	oui	8		
	< 120	0		
Tension	120 – 129	2		
artérielle systolique	130 – 139	3		
	140 – 159	5		
	≥ 160	8		
	< 0.91	11		
HDL-cholestérol	0.91 – 1.16	8		
[mmol/L]	1.17 – 1.41	5		
	≥ 1.42	0		
	< 1.14	0		
Triglycérides	1.14 – 1.70	2		
[mmol/L]	1.71 – 2.27	3		
	≥ 2.28	4		
	< 2.59	0		
151 1 1 1/ 1	2.59 – 3.36	5		
LDL-cholestérol [mmol/L]	3.37 – 4.13	10		
[1111101/ L]	4.14 – 4.91	14		
	≥ 4.92	20 —		
Somme				

Si les affections suivantes telles une maladie corona-
rienne, une athérosclérose, un diabète de type 2 ou de
type 1 avec atteinte des organes cible sont connues, il
existe, indépendamment du score GLSA, un risque très
élevé**!

un événement

Interprétation

intermédiaire

très élevé\*\*

Pour les patients avec un LDL-cholestérol > 4.9 mmol/L et une tension artérielle > 160 / 100 mmHg, il existe un risque élevé\*.

## Diabète sucré : diagnostic

 $HbA_{1c} \ge 6.5 \% ou Glucose à jeun > 7.0 mmol/L$ 

D'autres exemplaires du Vigaro, à distribuer aux patients, peuvent être commandés avec la carte de commande jointe.

**Prix** 

Cholestérol CHF 2.50 HDL CHF 3.20 LDL calculé gratuitement Triglycérides CHF 2.80 HbA<sub>1c</sub> CHF 17.80 Glucose CHF 2.50

**Information** Littérature sur demande

Dr méd. Petra Kohler, FMH Médecine interne, Cardiologie, responsable Cardiologie Dr méd. Ruth von Dahlen, FMH Médecine interne, Cardiologie, responsable adj. Cardiologie

Dr méd. Vânia Barbosa-Zaugg, FMH Cardiologie, Cardiologie