

Ferita da corpo contundente – cosa fare?

Esposizione a sangue ed altri liquidi corporei

Rischi

L'esposizione a sangue o altri liquidi corporei rappresenta un rischio per infezioni soprattutto per HIV, epatite B (HBV) ed epatite C (HCV).

Prevenzione


Le raccomandazioni della SUVA per la prevenzione di infezioni, in particolare nel contesto di prelievi di sangue, rappresentano i principi basilari di protezione da situazioni a rischio.

Profilassi

Tutte le persone operanti nell'ambito sanitario andrebbero vaccinate contro l'epatite B. Il successo della vaccinazione andrebbe documentato con una determinazione del titolo anticorpale per HBs. Per l'HIV e l'HCV non sono ancora disponibili delle vaccinazioni.

Interventi

In caso d'incidente è determinante un'azione rapida e decisa. La **profilassi post-esposizione (PEP) per l'HIV** è più efficace se viene introdotta senza indugio. Perciò tutte le esposizioni con elevato rischio per HIV andrebbero valutate al più presto da uno specialista infeziologo.



Diagnostica

	Paziente indice ('fonte')	Persona esposta ('vittima')	Intervento dopo esposizione in caso di costellazione a rischio
HIV	HIV-1+2 depistaggio ^{a)}	HIV-1+2 depistaggio	Profilassi post-esposizione (PEP) possibilmente entro le 2 ore
HBV	HBV depistaggio (HBs Ag + HBc Ac) ^{b)}	HBs Ac ^{b)}	Immunizzazione attiva e passiva entro 7 giorni
HCV	HCV depistaggio	HCV depistaggio	Nessuna → controllo ravvicinato; terapia precoce in caso di segni di un'infezione da HCV allo stadio iniziale

a) In caso di forte sospetto per un'infezione attiva / fresca o conosciuta: viremia HIV mediante PCR

b) Necessaria solo se la persona ferita non dispone di un'immunità vaccinale documentata > 100 IU/L.

Agire decisi

Tutti i chiarimenti vanno approntati con il **consenso delle persone coinvolte**. Nell'ottica di future analisi andrebbe costituita una **sieroteca**.

Per escludere un'infezione della persona esposta, l'ultimo controllo va eseguito 3 mesi dopo l'esposizione.

Indirizzi di contatto

Medico del servizio di infeziologia degli ospedali universitari o cantonali
Viollier: T +41 (0)61 486 11 11 → 24h / 24h

Prezzo

Secondo elenco federale delle analisi, fattura al mandante.
I costi per le analisi e gli interventi vanno a carico dell'assicurazione infortuni: annuncio e rimborso via datore di lavoro all'assicurazione infortuni.

Informazioni Letteratura su richiesta

Dr. sc. nat. ETH Diana Ciardo, FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile Outer Corelab a.i. / Sost. responsabile Microbiologia
Dr. phil. Il Claudia Lang, FAMH in medicina di laboratorio, Sost. responsabile Microbiologia / Sost. responsabile Outer Corelab

Redazione Dr. med. Dieter Burki, FAMH medicina di laboratorio, Responsabile del settore Produzione Ovest
contact@viollier.ch | www.viollier.ch