

LE VIGARO

230 / 12.2015

Più di una semplice newsletter di medicina di laboratorio

Dr. med. Edouard H. Viollier, FMH in medicina interna


Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Influenza stagionale

Influenza A/B, diagnostica PCR entro 3 h

Contesto

Ogni anno in Svizzera nel periodo invernale ca. 200'000 persone si ammalano di influenza stagionale di cui 1'000 – 5'000 vengono ospedalizzate e da 400 a 1'000 muoiono (Fonte UFSP).



Significato

- Una terapia specifica con inibitori della neuraminidasi mostra la massima efficacia se viene introdotta nelle 36 – 48 h dalla comparsa dei primi sintomi.
- Diagnostica dell'infezione negli studi medici e negli ospedali, in particolar modo nei pronti soccorso, in modo da limitare la propagazione dell'infezione ai pazienti ed al personale.

Accertamento

Nei primi giorni di un'infezione la sensibilità della ricerca biomolecolare dell'influenza A e B si situa oltre il 99%.

Preanalitica

Striscio faringeo e nasofaringeo, set per striscio di microbiologia (127)



Nuovo

Tutto il giorno dal lunedì al venerdì, giorno e notte, sabato e domenica
Risultato di PCR disponibile entro le 3 h dalla ricezione del campione

Prezzo

CHF 180.–

Informazioni Letteratura su richiesta

Dr. med. Olivier Dubuis, FAMH medicina di laboratorio, Responsabile Microbiologia

Dr. phil. Il Claudia Lang, FAMH in medicina di laboratorio, Sost. responsabile Microbiologia

Dr. sc. nat. ETH Diana Ciardo, FAMH in medicina di laboratorio, Sost. responsabile Corelab, Sost. responsabile Microbiologia

Redazione

Dr. med. Maurice Redondo, FMH in ematologia, FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile del settore Produzione Ovest