STS 0292

VIOLLIER

LE VIGARO

242 / 09.2016
Più di una semplice newsletter di medicina di laboratorio
Dr. med. Edouard H. Viollier, FMH in medicina interna
Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Decorso BCR-ABL

Efficiente controllo di terapia nella leucemia mieloide cronica

Contesto

Gli inibitori delle tirosin chinasi sono utilizzati nella terapia della leucemia mieloide cronica (CML). La risposta molecolare é di rilievo sia a livello prognostico che terapeutico. Con la determinazione del trascritto BCR-ABL specifico alla malattia, la genetica molecolare mette a disposizione un test eccellente per la diagnosi e il controllo della terapia. Il decorso molecolare accompagna il paziente a vita.

Vantaggi

- Detezione altamente sensibile di BCR-ABL tramite PCR Real Time per il controllo del successo della terapia
- Risultati entro 24 h secondo standard internazionale (IS)

Successo terapeutico in un colpo d'occhio



Indicazione

Leucemia mieloide cronica

Materiale

Gratuito su v-shop® → viollier.ch
Provetta EDTA, lilla (6), non centrifugata, no. art. 271

Prezzo

CHF 369.–

Informazioni Letteratura su richiesta
Dr. med. Maurice Redondo, FMH in ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile Corelab
Dr. med. Sabine Nann-Rütti, FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Sost. responsabile Corelab
Dr. phil. II Christoph Noppen, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile Genetica / Biologia molecolare
Dr. phil. nat. Florent Badiqué, Candidato Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Genetica / Biologia molecolare

Redazione
Dr. med. Maurice Redondo, FMH in ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile del settore Produzione Ovest