

LE VIGARO

254 / 02.2017

Più di una semplice newsletter di medicina di laboratorio

Dr. med. Edouard H. Viollier, FMH in medicina interna

Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Prescrizione supplementare

Da stoccaggio automatizzato dei campioni o da sieroteca richiesta

Contesto


Prescrivere analisi supplementari ad ogni momento e senza ulteriore fatturazione della tassa amministrativa a partire da materiale d'analisi disponibile, evita una diagnostica insufficiente o eccessiva. Lei contribuisce in questo modo ad aumentare la qualità e ottimizzare il rapporto tra costi ed efficacia della medicina di laboratorio.

Sistema di stoccaggio automatizzato

Dopo l'esecuzione dell'analitica il materiale d'analisi inviato viene conservato a +4°C per sette giorni in un sistema di stoccaggio completamente automatizzato. 94% delle prescrizioni supplementari sono richieste in questo arco di tempo. Se Lei desidera uno stoccaggio più lungo, può richiedere esplicitamente una sieroteca al momento della prescrizione iniziale.

Sieroteca

Per garantire la miglior qualità possibile e la massima sicurezza, in caso di prescrizione di una sieroteca vengono archiviate per un anno a -20°C unicamente provette siero con gel, giallo oro (1), centrifugate, inviate espressamente a questo scopo e non aperte



Prescrizione supplementare

Durante la prescrizione supplementare in v-consult® Lei vede sempre quali analisi aggiuntive possono essere effettuate a partire dal materiale inviato, dopo controllo automatico di materiale di prova e stabilità. Analisi evidenziate in grigio non possono essere richieste.

Prescrizione supplementare in ogni momento

Home

Nuova richiesta

Paziente

Analisi / Formulare

Individuale

Patologia

Ulteriori

Conferma

Richieste

Impostazioni

Disconnetti

Analisi selezionate

☒ Vit. B12, attiva (olo-Tc)

☒ Acido metilmalonico

☒ Creatinina (incl. GFR)

Questa è una prescrizione supplementare. Possono essere richieste solo analisi per le quali è già presente il materiale necessario.

Carenza di vitamina B12 (vitamina B12)

Risultati della ricerca secondo l'indicazione: vitamina B12

Indicazione primaria	Indicazione allargata	Tem correlati
☐ Selezionare tutto ☒ Vit. B12, attiva (olo-Tc) ☐ Emogramma V	☐ Selezionare tutto ☒ Acido metilmalonico ☐ Omocisteina ☐ Reticolociti + HG I ☐ Fatt. intr. + cellule parietali IgG ☒ Creatinina (incl. GFR)	Gastrite, atrofica Anemia Carenza di vitamina B12 Polineuropatia Le Vigaro – vitamina B12 attiva (olotranscobalamina) Le Vigaro – Acido metilmalonico (AMM)

Già 90 minuti dopo la prescrizione supplementare i risultati di più di 350 analisi sono disponibili elettronicamente (vedi 24/7 assortimento analisi → viollier/24-7).

Informazioni

Bettina Rogger, BSc. in Exercise and Health Science, Sost. responsabile dell'Accettazione dei campioni

Dr. rer. nat. Jürgen Carlsen, capo progetto ICT

Redazione

Dr. med. Maurice Redondo, FMH in ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile del settore Produzione Ovest