

Mycoses unguéales: Diagnostic focalisé avant l'instauration du traitement

Indications

- Confirmation du diagnostic clinique avant le traitement
- Exclusion d'autres affections unguéales

Etiologie

- **Dermatophytes**
Trichophyton species (par ex. T. rubrum, T. mentagrophytes)
Microsporum species
Epidermophyton floccosum
- **Moisissures**
- **Levures**

Préanalytique

- Enlever les particules friables de kératine et désinfecter l'ongle avec de l'alcool
- Prélever une grande quantité de copeaux d'ongle au niveau des couches profondes en des endroits où le tissu malade est en contact immédiat avec le tissu sain
- Envoyer le prélèvement dans un tube stérile, jaune

Analytique

Microscopie de l'examen direct, cultures durant au moins 3 semaines.

Interprétation

Examen direct	Cultures	Mycose unguéale
positif	Dermatophytes, moisissures, levures *	confirmée
négatif	Dermatophytes	probable
négatif	Moisissures, levures	improbable

* Les moisissures et les levures sont souvent des contaminants. Leur présence n'est significative que s'ils sont mis en évidence de façon répétée.

Communication

Dr méd. Paul Friderich, spécialiste FAMH en microbiologie médicale,
responsable du service Bactériologie

Tarif négatif 50 TP / Fr. 50.--
 positif 80 TP / Fr. 80.--

Littérature sur demande