

Hepatitis C: Abklärung

Hintergrund

Bis zu 70'000 Personen in der Schweiz sind mit dem Hepatitis C Virus infiziert. Mindestens die Hälfte davon entwickelt eine chronische Hepatitis mit erhöhtem Risiko für Leberzirrhose und hepatozelluläres Karzinom. Neue Therapien erlauben eine Heilung bei einem Teil der chronisch infizierten Patienten. Dies rechtfertigt bei reaktivem Suchtest die Suche nach einer aktiven Infektion. Dazu wird empfohlen, primär die qualitative PCR aus dem Serum durchzuführen. Der bisher zur serologischen Bestätigung eingesetzte Immunoblot erfolgt nur noch bei negativer PCR.


Indikation

- Risiko
 - perkutane Verletzung mit blutkontaminiertem Gegenstand
 - Bluttransfusionen vor 1992
- Transaminasen erhöht
- chronische Müdigkeit

Suchtest



Bestätigung



Verlaufskontrolle



* Bei grenzwertigem oder schwach reaktivem Suchtest wird zuerst der HCV Ak Bestätigungstest durchgeführt

Material / Tarife

HCV Ak Suchtest:	Serum Gel-Tube, goldgelb, zentrifugiert	TP 40 / CHF 40.–
HCV PCR ql:	EDTA-Tube, lila / Serum Gel-Tube goldgelb, zentrifugiert	TP 200 / CHF 200.–
HCV Immunoblot:	Serum Gel-Tube, goldgelb	TP 80 / CHF 80.–
HCV PCR qn:	EDTA-Tube, lila	TP 275 / CHF 275.–
HCV Genotyp:	EDTA-Tube, lila	TP 275 / CHF 275.–

Information

PD Dr. med. Lukas Matter, Leiter Immunologie
Dr. med. Dieter Burki, stv. Leiter Immunologie
Literatur auf Anfrage