

Hépatite C : dépistage

Introduction

Près de 70'000 personnes sont infectées par le virus de l'hépatite C en Suisse. Plus de la moitié d'entre elles développent une hépatite chronique avec risque accru de cirrhose du foie et de carcinome hépatocellulaire. Les nouvelles thérapies permettent de guérir une partie des patients chroniquement infectés; cela justifie, en cas de test de dépistage réactif, la recherche d'une infection active. Il est recommandé d'effectuer en premier lieu une PCR qualitative à partir de sérum. L'immunoblot utilisé jusqu'ici pour confirmation sérologique n'est plus pratiqué qu'en cas de PCR négative.


Indication

- Situation à risque
 - blessure percutanée avec un objet contaminé par du sang
 - transfusions sanguines effectuées avant 1992
- élévation des transaminases
- fatigue chronique

Dépistage



Confirmation



Contrôle de l'évolution

* En cas de test de dépistage limite ou faiblement réactif, effectuer en premier lieu le test de confirmation des HCV Ac.

Matériel / Tarifs

HCV Ac dépistage :	Tube sérum gel, jaune or, centrifugé	PT 40 / CHF 40.-
HCV PCR ql :	Tube EDTA, lilas / Tube sérum gel, jaune or, centrifugé	PT 200 / CHF 200.-
HCV Immunoblot :	Tube sérum gel, jaune or	PT 80 / CHF 80.-
HCV PCR qn :	Tube EDTA, lilas	PT 275 / CHF 275.-
HCV génotype :	Tube EDTA, lilas	PT 275 / CHF 275.-

Information

PD Dr méd. Lukas Matter, responsable Immunologie
Dr méd. Dieter Burki, responsable adjoint Immunologie
Littérature sur demande