

Epatite C: accertamenti

Razionale

In Svizzera, almeno 70'000 persone presentano un'infezione dovuta al virus dell'epatite C. Almeno la metà evolvono in epatite cronica con un rischio accresciuto di cirrosi epatica e carcinoma epatocellulare. Nuove terapie permettono ad una parte di questi pazienti infettati cronicamente di guarire. Questo giustifica, in caso di test di depistaggio reattivo, la ricerca di un'infezione attiva. Consigliamo di eseguire primariamente una PCR qualitativa dal siero. L'immunoblot, eseguito fino ad ora quale conferma, resterà riservato per le situazioni con PCR negativa.


Indicazione

- Rischio
 - lesione percutanea con strumento contaminato con sangue infetto
 - trasfusione di sangue antecedente al 1992
- Elevazione delle transaminasi
- Stanchezza cronica

Test di depistaggio



Conferma



Controllo del decorso

* in caso di risultato al limite o test di depistaggio debolmente positivo verrà eseguito un test di conferma degli anticorpi HCV

Materiale / Tariffa

HCV Ac depistaggio:	provetta siero con gel, gialla-oro, centrifugato	PT 40 / CHF 40.-
HCV PCR ql:	provetta EDTA, lilla / provetta siero con gel, gialla-oro, centrifugato	PT 200 / CHF 200.-
HCV immunoblot:	provetta siero con gel, gialla-oro, centrifugato	PT 80 / CHF 80.-
HCV PCR qn:	provetta EDTA, lilla	PT 275 / CHF 275.-
HCV genotipo:	provetta EDTA, lilla	PT 275 / CHF 275.-

Informazioni

PD Dr. med. Lukas Matter, responsabile immunologia
Dr. med. Dieter Burki, sost. responsabile immunologia
Letteratura su richiesta