



336 / 09.2022

Più di una semplice newsletter di medicina di laboratorio Dr. med. Edouard H. Viollier, FMH medicina interna Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Genotipo Rhesus-D fetale

Esame prenatale non invasivo (NIPT) nel sangue materno

Contesto

Profilassi RhD utilizzata in modo efficace In Europa circa il 15 % delle donne hanno un fattore Rhesus-D (RhD) negativo. Durante la prima gravidanza esiste per loro il pericolo di sensibilizzazione da parte di eritrociti RhD positivi fetali. Nelle successive gravidanze, per un feto RhD positivo esiste il pericolo di un Morbus haemolyticus fetalis / neonatorum. Per evitare una sensibilizzazione, le donne RhD negative ricevono una profilassi anti-D prima e dopo il parto. In caso di stato RhD negativo del feto questo è superfluo e può essere evitato tramite una analisi del genotipo Rhesus-D fetale prima della nascita.



Risultato	Incidenza	Raccomandazione
RhD fetale positivo	Ca. 60% delle gestanti	Profilassi RhD
RhD fetale negativo	Ca. 40% delle gestanti	Nessuna profilassi RhD
Nessun risultato, p. es. a causa di varianti genetiche o polimorfismi	Raro	Profilassi RhD

Indicazione Gestanti RhD negative con gravidanza singola

SSGO Opinione degli esperti n. 68: Raccomandazioni per la somministrazione

di immunoglobuline anti-D in gravidanza (profilassi anti-D)

Esecuzione Possibile a partire dalla 12^a SDG (SDG 11+0)

Significatività Sensibilità / specificità > 99%. Indipendentemente dal risultato del RhD-NIPT, nel neonato

deve essere effettuata la determinazione sierologica del fattore RhD del gruppo sanguigno

dopo il parto.

Metodo Real-Time PCR di DNA libero circolante

Materiale 2 x provetta EDTA, lilla (6) o

set di prelievo v-natal®: 2 provette Cell-Free DNA™ BCT (06D), non centrifugate

Prezzo CHF 155.70

Informazioni Letteratura su richiesta

PD Dr. med. Giuseppe Colucci, FMH in medicina interna, Ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Outer Corelab PD Dr. phil. II Christian Kalberer, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Sost. responsabile Outer Corelab Dr. med. Maurice Redondo, FMH ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile del settore Produzione centrale PD Dr. med. Boris E. Schleiffenbaum, FMH in ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, medico consulente per l'ematologia Dr. phil. II Christoph Noppen, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile Diagnostica molecolare

Redazione

Dr. med. Uta Deus, FMH medicina interna generale, Candidata specialista FAMH in medicina di laboratorio, Produzione centrale Dr. med. Maurice Redondo, FMH ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, Responsabile del settore Produzione centrale